

Lezione 3 & 4: esercizi

Esercizio 1. Si consideri la matrice

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Si calcoli attraverso il metodo diretto e^{Ft} , $t \geq 0$.

Esercizio 2. Si consideri la matrice

$$F = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 \\ -f_2 & f_1 \end{bmatrix} \quad f_1, f_2 \in \mathbb{R}.$$

Si calcoli attraverso il metodo diretto e^{Ft} , $t \geq 0$.

Esercizio 3. Si consideri la matrice

$$F = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1+f & 1 \end{bmatrix}, \quad f \in \mathbb{R}.$$

Si determinino gli autovalori di F e le molteplicità algebriche e geometriche degli autovalori di F al variare del parametro $f \in \mathbb{R}$. Per quali valori di $f \in \mathbb{R}$ la matrice F è diagonalizzabile?

Esercizio 4. Si consideri la matrice

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Se possibile, si calcoli e^{Ft} , $t \geq 0$, tramite diagonalizzazione di F .

Soluzioni

$$\text{Esercizio 1. } e^{Ft} = \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{3t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & 0 & 0 & e^{2t} \end{bmatrix}.$$

$$\text{Esercizio 2. } e^{Ft} = e^{f_1 t} \begin{bmatrix} \cos(f_2 t) & \sin(f_2 t) \\ -\sin(f_2 t) & \cos(f_2 t) \end{bmatrix}.$$

$$\text{Esercizio 3. } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \nu_1 = 2, \nu_2 = 1, g_1 = \begin{cases} 1 & f \neq -2 \\ 2 & f = -2 \end{cases}, g_2 = 1. F \text{ diagonalizzabile se } f = -2.$$

$$\text{Esercizio 4. } e^{Ft} = T e^{F_D t} T^{-1}, T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, F_D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$