

In questa lezione: esercizi!

▷ Esercizio 1: equilibri con ingressi costanti

▷ Esercizio 2: stabilità di sistemi non lineari

▷ Esercizio 3: equazione di Lyapunov

Esercizio 1 [Es. 1 tema d'esame 24 Giugno 2019]

$$\begin{cases} x_1(t+1) = x_2^2(t) \\ x_2(t+1) = \alpha x_2(t) + u(t) \end{cases} \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

1. Equilibri del sistema per $u(t) = \bar{u} = \text{cost. } \forall t$?
2. Stabilità degli equilibri trovati usando il teorema di linearizzazione?

Esercizio 1: soluzione

1. $\alpha \neq 1$: unico equilibrio $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{\bar{u}^2}{(1-\alpha)^2} \\ \frac{\bar{u}}{1-\alpha} \end{bmatrix}$.

$\alpha = 1$: nessun equilibrio se $\bar{u} \neq 0$, infiniti equilibri $\begin{bmatrix} \beta^2 \\ \beta \end{bmatrix}$, $\beta \in \mathbb{R}$ se $\bar{u} = 0$.

2. equilibri asintoticamente stabili se $|\alpha| < 1$ e instabili se $|\alpha| > 1$.

Esercizio 2

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \alpha x_1 + x_1 x_2^2 + x_2^3 \\ \dot{x}_2 = -(1 + \alpha)x_2 - x_1 x_2^2 - x_1^2 x_2 \end{cases} \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^\top$$

1. Stabilità di \bar{x} al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$ usando il teorema di linearizzazione?

2. Nei casi critici usare la funzione $V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$.
