

Teoria dei Sistemi e Controllo Ottimo e Adattativo (C. I.)  
Teoria dei Sistemi (Mod. A)

Docente: Giacomo Baggio

Lez. 3: Soluzioni di sistemi lineari

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica

A.A. 2020-2021



noi siamo qui

concetto di sistema

modelli in  
spazio di stato

soluzioni e  
analisi modale

equilibri e  
linearizzazione

raggiungibilità  
e controllabilità

stabilità

retroazione  
dallo stato

osservabilità e  
ricostruibilità

stimatori  
dello stato


sintesi del  
regolatore



## In questa lezione

- ▷ Esempi di sistemi a tempo continuo e discreto
- ▷ Soluzioni di un sistema autonomo
- ▷ Esponenziale di matrice
- ▷ Calcolo dell'esponenziale di matrice: metodo diretto

# Massa-molla-smorzatore



Rappresentazione esterna

$$m\ddot{z} + \beta\dot{z} + kz - f = 0$$

$$\text{F.d.T. } G(s) = \frac{1}{ms^2 + \beta s + k}$$

$f(t) = \text{input}$ ,  $z(t) = \text{output}$

Rappresentazione (esterna ed) interna?

Rappresentazione interna (di stato)


$$x_1 = z, x_2 = \dot{x}, u = f, y = x_1 = z$$

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}$$
$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, J = 0$$

# Estinzione debito



pagamento rata/aggiornamento debito



$y(t)$  = debito al tempo  $t$  = output

$u(t)$  = rata al tempo  $t$  = input

$l$  = tasso di interesse (decimale)

Rappresentazione esterna

$$y(t+1) - (1+l)y(t) + u(t+1) = 0$$

$$\text{F.d.T. } G(z) = -\frac{z}{z - (1+l)}$$


Rappresentazione interna (di stato)

$$x_1(t) = x(t) = y(t) + u(t)$$

$$F = 1 + l, G = -1 - l$$

$$H = 1, J = -1$$


# Soluzioni di un sistema LTI autonomo



$\Sigma$  lineare, tempo invariante e autonomo       $x(t) \in \mathbb{R}^n, y(t) \in \mathbb{R}^p, u(t) \equiv 0$

Tempo continuo:       $\dot{x}(t) = Fx(t)$        $x(0) = x_0$   
                               $y(t) = Hx(t)$

# Soluzioni di un sistema LTI autonomo: caso scalare




Caso scalare  $x(t) = y(t) \in \mathbb{R}$

$$\dot{x}(t) = fx(t), \quad x(0) = x_0$$

$$x(t) = e^{ft} x_0 = \left( 1 + ft + \frac{f^2 t^2}{2!} + \dots + \frac{f^k t^k}{k!} + \dots \right) x_0$$

# Soluzioni di un sistema LTI autonomo: caso vettoriale



Caso vettoriale  $x(t) = y(t) \in \mathbb{R}^n$

$$\dot{x}(t) = Fx(t), \quad x(0) = x_0$$

$$x(t) = e^{Ft} x_0 \triangleq \left( I + Ft + \frac{F^2 t^2}{2!} + \cdots + \frac{F^k t^k}{k!} + \cdots \right) x_0$$



# Esponenziale di matrice e sue proprietà

**Definizione:** L'esponenziale di una matrice  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  è definito come

$$e^A \triangleq \sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}.$$

**NB:**  $e^A$  è sempre ben definito perché la serie  $\sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}$  converge sempre!

**(Alcune) proprietà:**

- ①  $e^0 = I$
- ②  $(e^A)^\top = e^{(A^\top)}$
- ③  $AB = BA \implies e^{A+B} = e^A e^B$
- ④  $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$  invertibile:  $e^{TAT^{-1}} = Te^A T^{-1}$

## Come calcolare $e^{Ft}$ , $F \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ?

Usiamo la definizione: 
$$e^{Ft} \triangleq \sum_{k \geq 0} \frac{F^k t^k}{k!}$$

**Esempio 1:**  $F = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

$$(Ft)^n = \underbrace{F \cdot F \cdots F}_{n \text{ volte}} t^n = \begin{bmatrix} t^n & 0 \\ 0 & (2t)^n \end{bmatrix} \implies e^{Ft} = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix}$$

## Come calcolare $e^{Ft}$ , $F \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ?

Usiamo la definizione: 
$$e^{Ft} \triangleq \sum_{k \geq 0} \frac{F^k t^k}{k!}$$

caso più in generale:  $F$  diagonale

$$F = \begin{bmatrix} f_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & f_n \end{bmatrix} \implies e^{Ft} = \begin{bmatrix} e^{f_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{f_2 t} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & e^{f_n t} \end{bmatrix}$$

## Come calcolare $e^{Ft}$ , $F \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ?

Usiamo la definizione: 
$$e^{Ft} \triangleq \sum_{k \geq 0} \frac{F^k t^k}{k!}$$

**Esempio 2:**  $F = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I + N$ ,  $N \triangleq \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(i)  $N^0 = I$ ,  $N^1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $N^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \dots$

(ii)  $e^{I+N} = e^I e^N$

$$\implies e^{Ft} = \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix}$$

## Come calcolare $e^{Ft}$ , $F \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ?

Usiamo la definizione: 
$$e^{Ft} \triangleq \sum_{k \geq 0} \frac{F^k t^k}{k!}$$

**Esempio 3:**  $F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I + N$ ,  $N \triangleq \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(i)  $N^0 = I$ ,  $N^1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $N^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \dots$

(ii)  $e^{I+N} = e^I e^N$

$\implies e^{Ft} = \begin{bmatrix} e^t & te^t & \frac{t^2}{2!}e^t \\ 0 & e^t & te^t \\ 0 & 0 & e^t \end{bmatrix}$

## Come calcolare $e^{Ft}$ , $F \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ?

Usiamo la definizione: 
$$e^{Ft} \triangleq \sum_{k \geq 0} \frac{F^k t^k}{k!}$$

caso più in generale:  $F$  “quasi”-diagonale

$$F = \begin{bmatrix} f & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & f & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & f & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & f \end{bmatrix} \implies e^{Ft} = \begin{bmatrix} e^{ft} & te^{ft} & \cdots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{ft} \\ 0 & e^{ft} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & te^{ft} \\ 0 & \cdots & 0 & e^{ft} \end{bmatrix}$$

## Come calcolare $e^{Ft}$ , $F \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ?

Usiamo la definizione: 
$$e^{Ft} \triangleq \sum_{k \geq 0} \frac{F^k t^k}{k!}$$

**Esempio 4:**  $F = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

$$F^0 = I, F^1 = F, F^2 = -I, F^3 = -F, F^4 = I, \dots \implies e^{Ft} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}$$

## Come calcolare $e^{Ft}$ , $F \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ?

Usiamo la definizione: 
$$e^{Ft} \triangleq \sum_{k \geq 0} \frac{F^k t^k}{k!}$$

**Esempio 5:**  $F = F^2$

$$F^0 = I, F^k = F, k \geq 1 \implies e^{Ft} = I + (e^t - 1)F$$



Come calcolare  $e^{Ft}$ ,  $F \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ?

Usiamo la definizione: 
$$e^{Ft} \triangleq \sum_{k \geq 0} \frac{F^k t^k}{k!}$$

**Esempio 6:**  $F = vu^T$ ,  $v, u \in \mathbb{R}^n$

$$F^0 = I, F^k = (u^T v) F^{k-1}, k \geq 1 \implies e^{Ft} = I + \frac{(e^{u^T v t} - 1)}{u^T v} F$$

# Calcolo diretto di $e^{Ft}$

Metodo di calcolo diretto tramite definizione

utile in casi “semplici” e/o “strutturati”...

*....ma come fare in casi più complessi ( $F$  “piena” e senza “struttura”)?*

Strategia: Trasformare  $F$  in una forma “semplice” (diagonale o quasi-diagonale)!