


Teoria dei Sistemi e Controllo Ottimo e Adattativo (C. I.)
Teoria dei Sistemi (Mod. A)

Docente: Giacomo Baggio

Lez. 7: Modi di un sistema lineare, risposta libera e forzata
(tempo discreto)


Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica
A.A. 2020-2021



In questa lezione

- ▷ Modi elementari e evoluzione libera di un sistema lineare a tempo discreto
- ▷ Analisi modale di un sistema lineare a tempo discreto
- ▷ Evoluzione forzata di un sistema lineare a tempo discreto

Soluzioni di un sistema lineare autonomo?



Caso vettoriale $x(t) = y(t) \in \mathbb{R}^n$

$$x(t+1) = Fx(t), \quad x(0) = x_0$$

$$x(t) = F^t x_0$$

Calcolo di F^t tramite Jordan

1. $F = TF_J T^{-1} \implies F^t = TF_J^t T^{-1}$

2. $F_J = \begin{bmatrix} J_{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{\lambda_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & J_{\lambda_k} \end{bmatrix} \implies F_J^t = \begin{bmatrix} J_{\lambda_1}^t & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{\lambda_2}^t & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & J_{\lambda_k}^t \end{bmatrix}$

3. $J_{\lambda_i} = \begin{bmatrix} J_{\lambda_i,1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{\lambda_i,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & J_{\lambda_i,g_i} \end{bmatrix} \implies J_{\lambda_i}^t = \begin{bmatrix} J_{\lambda_i,1}^t & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{\lambda_i,2}^t & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & J_{\lambda_i,g_i}^t \end{bmatrix}$

Calcolo di F^t tramite Jordan

4(i). $J_{\lambda_i,j} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{r_{ij} \times r_{ij}} \implies J_{\lambda_i,j}^t = (\lambda_i I + N)^t, \quad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$\implies J_{\lambda_i,j}^t = \begin{bmatrix} \binom{t}{0} \lambda_i^t & \binom{t}{1} \lambda_i^{t-1} & \binom{t}{2} \lambda_i^{t-2} & \cdots & \binom{t}{r_{ij}-1} \lambda_i^{t-r_{ij}+1} \\ 0 & \binom{t}{0} \lambda_i^t & \binom{t}{1} \lambda_i^t & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \binom{t}{2} \lambda_i^{t-2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \binom{t}{1} \lambda_i^{t-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \binom{t}{0} \lambda_i^t \end{bmatrix}$$

Calcolo di F^t tramite Jordan

$$4(ii). J_{\lambda_i, j} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{r_{ij} \times r_{ij}} \xrightarrow{\lambda_i = 0} J_{\lambda_i, j}^t = N^t, \quad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow J_{\lambda_i, j}^t = \begin{bmatrix} \delta(t) & \delta(t-1) & \delta(t-2) & \cdots & \delta(t-r_{ij}+1) \\ 0 & \delta(t) & \delta(t-1) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \delta(t-2) \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \delta(t-1) \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \delta(t) \end{bmatrix}$$

Modi elementari

$$\binom{t}{0} \lambda_i^t, \binom{t}{1} \lambda_i^{t-1}, \binom{t}{2} \lambda_i^{t-2}, \dots, \binom{t}{r_{ij}-1} \lambda_i^{t-r_{ij}+1} = \text{Modi elementari del sistema}$$

$\delta(t), \delta(t-1), \delta(t-2), \dots, \delta(t-r_{ij}+1)$

1. $\lambda_i \neq 0$: $\binom{t}{k} \lambda_i^{t-k} \sim t^k \lambda_i^t = t^k e^{t(\ln \lambda_i)}$ ($\ln(\cdot)$ = logaritmo naturale complesso)

2. $\lambda_i = 0$: modi elementari si annullano dopo un numero finito di passi !

Non esiste una controparte modale a tempo continuo !!

Evoluzione libera

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t), \quad x(0) = x_0$$


$$y(t) = Hx(t) + Ju(t)$$

$$y(t) = y_\ell(t) = HF^t x_0 = \sum_{i,j} t^j \lambda_i^t v_{ij} + \sum_j \delta(t-j) w_j$$

= combinazione lineare dei modi elementari

Carattere dei modi elementari

modo associato a $\lambda_i = \sigma_i + i\omega_i$



Evoluzione forzata

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t), \quad x(0) = x_0$$

$$y(t) = Hx(t) + Ju(t)$$

$$x(t) = \underbrace{F^t x_0}_{=x_\ell(t)} + \underbrace{\sum_{k=0}^{t-1} F^{t-k-1} Gu(k)}_{=x_f(t)}$$

$$y(t) = \underbrace{HF^t x_0}_{=y_\ell(t)} + \underbrace{\sum_{k=0}^{t-1} HF^{t-k-1} Gu(k)}_{=y_f(t)} + Ju(t)$$

$$w(t) = \text{risposta impulsiva} = \begin{cases} J, & t = 0 \\ HF^t G, & t \geq 1 \end{cases}$$

Evoluzione forzata

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t), \quad x(0) = x_0$$

$$y(t) = Hx(t) + Ju(t)$$

$$x(t) = \underbrace{F^t x_0}_{=x_\ell(t)} + \underbrace{\sum_{k=0}^{t-1} F^{t-k-1} Gu(k)}_{=x_f(t)} = \underbrace{F^t x_0}_{=x_\ell(t)} + \underbrace{\mathcal{R}_t u_t}_{=x_f(t)} \quad u_t \triangleq \begin{bmatrix} u(t-1) \\ u(t-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}$$

$$y(t) = \underbrace{HF^t x_0}_{=y_\ell(t)} + \underbrace{\sum_{k=0}^{t-1} HF^{t-k-1} Gu(k)}_{=y_f(t)} + Ju(t) = \underbrace{HF^t x_0}_{=y_\ell(t)} + \underbrace{H\mathcal{R}_t u_t + Ju(t)}_{=y_f(t)}$$

$$\mathcal{R}_t \triangleq \begin{bmatrix} G & FG & F^2G & \dots & F^{t-1}G \end{bmatrix} = \text{matrice di raggiungibilit\`a in } t \text{ passi}$$

Evoluzione forzata (con trasformata Zeta)

$$zX(z) - zx_0 = FX(z) + GU(z)$$

$$Y(z) = HX(z) + JU(z)$$

$$V(z) \triangleq \mathcal{Z}[v(t)] = \sum_{t=0}^{\infty} v(t)z^{-t}$$

$$X(z) = \underbrace{z(zI - F)^{-1}x_0}_{=X_\ell(z)} + \underbrace{(zI - F)^{-1}G}_{=X_f(z)}$$

$$Y(z) = \underbrace{Hz(zI - F)^{-1}x_0}_{=Y_\ell(z)} + \underbrace{[H(zI - F)^{-1}G + J]U(z)}_{=Y_f(z)}$$

Equivalenze dominio temporale/Zeta

1. $W(z) = \mathcal{Z}[w(t)] = H(zI - F)^{-1}G + J =$ matrice di trasferimento

2. $\mathcal{Z}[F^t] = z(zI - F)^{-1} =$ metodo alternativo per calcolare F^t !!

Struttura della matrice di trasferimento

$T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ = base di Jordan

$$(F, G, H, J) \xrightarrow{z= T^{-1}x} (F_J = T^{-1}FT, G_J = T^{-1}G, H_J = HT, J_J = J)$$

$$W(z) = W_J(z) = H_J(zI - F_J)^{-1}G_J + J$$

Struttura della matrice di trasferimento

$$F_J = \begin{bmatrix} J_{\lambda_{1,1}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{\lambda_{1,2}} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & J_{\lambda_{k,g_k}} \end{bmatrix}, \quad G_J = \begin{bmatrix} G_{\lambda_{1,1}} \\ G_{\lambda_{1,2}} \\ \vdots \\ G_{\lambda_{k,g_k}} \end{bmatrix}, \quad H_J = [H_{\lambda_{1,1}} \mid H_{\lambda_{1,2}} \mid \cdots \mid H_{\lambda_{k,g_k}}]$$

$$\begin{aligned} W(z) &= H_{\lambda_{1,1}}(zI - J_{\lambda_{1,1}})^{-1}G_{\lambda_{1,1}} + H_{\lambda_{1,2}}(zI - J_{\lambda_{1,2}})^{-1}G_{\lambda_{1,2}} + \cdots + H_{\lambda_{k,g_k}}(zI - J_{\lambda_{k,g_k}})^{-1}G_{\lambda_{k,g_k}} + J \\ &= W_{\lambda_{1,1}}(z) + W_{\lambda_{1,2}}(z) + \cdots + W_{\lambda_{k,g_k}}(z) + J \end{aligned}$$
